

PIANO DI PREVENZIONE E LOTTA CONTRO LE ZANZARE A CALDERARA DI RENO Anno 2007

Come ormai avviene da diversi anni, il Comune di Calderara di Reno sta predisponendo, per tempo, la campagna di prevenzione e lotta contro le zanzare autoctone (*Culex pipiens* e *Aedes caspius*) e contro la Zanzara Tigre (*Aedes albopictus*). Di seguito sono riportate le principali linee d'intervento.

ZANZARE AUTOCTONE

FOCOLAI PUBBLICI

Riguarda il reticolo idrico superficiale composto di canali di bonifica, d'irrigazione, dai fossi stradali e dagli scoli pubblici di raccolta delle acque reflue.

Gli interventi di disinfestazione sui corsi d'acqua saranno eseguiti mediante automezzi 4x4 dotati di braccio telescopico idraulico portante all'estremità una serie di ugelli di diverso diametro, montati su lancia. In caso di necessità si farà anche uso di irroratrici manuali portate a spalla.

Gli interventi larvicidi interesseranno il periodo compreso tra la seconda decade di maggio e la fine di settembre. Il formulato insetticida sarà a base di *B.t.i.* ([link scheda n.1](#)), prodotto biologico non tossico per l'uomo e gli organismi acquatici.

Eliminato: 2

Di seguito forniamo un elenco dei canali e fossi trattati con maggiore frequenza:

NOME FOCOLAIO
torre monari
via Stelloni ponente
fosso x
Bonifica 6-9
via Fornace sotto
Peloso 6-8
via Bargellino 7-13
via Bazzane 16
via Rizzola ponente
parallelo Peloso 1-6
Peloso 1-5
scolo Cava
via Fornace sopra
via Parma
villa Donini campo
via Stradone
Canocchietta di Sala

INTERVENTI FOCOLAI PERMANENTI	
Mese	Turni (n.)
Maggio	2
Giugno	4
Luglio	4
Agosto	4
Settembre	4

Eliminato: 2

Eliminato: 182

Eliminato: ¶
¶
¶

LOTTA CONTRO LA ZANZARA TIGRE (*Aedes albopictus*)

TRATTAMENTO CADITOIE PUBBLICHE E PRIVATE

Da maggio ad ottobre si prevedono 4 turni di disinfestazione delle caditoie pubbliche e private dell'abitato di Calderara capoluogo, Lippo, Longara, Tavernelle e Bargellino. Il trattamento verrà effettuato da operatori con pompa a spalla. Il prodotto larvicida considerato è l'ABACIDE 48 E a base di *temephos* ([link scheda tecnica n.2](#)) fino ad esaurimento delle scorte, successivamente si utilizzerà un regolatore di crescita il SUMILARV 0.5G a base di Pyriproxyfen ([link scheda tecnica n. 3](#)).

I cittadini assenti da casa al passaggio degli operatori incaricati dal Comune, possono ritirare il prodotto biologico (gratuito) in formulazione granulare per trattare i tombini di loro proprietà, nei seguenti punti di distribuzione:

U.R.P. - Ufficio Relazioni con il Pubblico

Sede Municipale - Calderara capoluogo Piazza Marconi, 7 - Tel 051 - 6461274

Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8,00 alle 13,00

Giovedì dalle 8,00 alle 19,00

Sede decentrata di Lippo Via Castaldini n. 3/a - Tel. 051 - 726828

Mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Sede decentrata di Longara presso il Centro Civico - Via Longarola n. 33/a - Tel. 051 724130

Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00;

Bar trattoria Gianna Castel Campeggi Via Longarola

dalle ore 8,00 alle ore 23,00 escluso il lunedì.

MONITORAGGIO

Per verificare l'estensione dell'areale infestato e per indirizzare le attività di lotta in maniera puntuale e tempestiva, dalla metà di maggio e fino ai primi d'ottobre, sarà attivata, nelle aree abitate del territorio comunale, una rete di 48 ovitrappole ([link foto ovitrappola](#)). L'ovitrappola è costituita da un bicchiere di plastica, di colore nero, della capacità di 400 cc circa, forato a $\frac{3}{4}$ di altezza per il troppo pieno. All'interno del bicchiere viene posta una listella di masonite sulla quale le femmine depongono le uova. Ad intervalli di 14 giorni la listella è sostituita per il conteggio del numero di uova.

Eliminato: attrave

SOPRALLUOGHI SU SEGNALAZIONE, RICERCA ED ELIMINAZIONE DEI FOCOLAI ATTIVI E POTENZIALI

La rimozione dei microfocolai ([link foto di microfocolai](#)) sarà [condotta sulla base delle segnalazioni della cittadinanza e delle evidenze ottenute dal monitoraggio](#) nel periodo da giugno ad ottobre. I sopralluoghi saranno realizzati nel raggio di circa 50-100 m intorno all'ovitrappola positiva o all'abitazione dalla quale perverrà la segnalazione cercando di individuare e rimuovere gli eventuali microfocolai e svolgendo un'attività d'informazione (con colloqui diretti e distribuzione di depliant) circa i mezzi di prevenzione e di lotta in ambito domestico.

Eliminato: Operativamente si potrebbe iniziare questa attività precocemente in primavera (marzo) in modo da svolgere contemporaneamente alla mappatura un'azione di ricerca ed eliminazione dei microfocolai. ¶

Eliminato: poi intensificata

Eliminato: sulla base dei dati raccolti con il monitoraggio ed in seguito alle segnalazioni della cittadinanza. ¶

Eliminato: Inoltre durante i sopralluoghi saranno distribuiti fili di rame da utilizzare nei sottovasi. ¶